

FICHA TÉCNICA

FRUTIPAC



USO FOLIAR

Es una formulación líquida (SL) que contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona calcio, boro. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de Activación y Respuesta en el proceso de formación de cera o pruina y término y post cosecha de la fruta. El

BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES EN POST COSECHA

El silicio tiene el beneficio de conferir elasticidad y firmeza en la fruta. Se recomienda en especies frutales y cultivos hortícolas.

El silicio, calcio y boro favorecen la firmeza y elasticidad de la epidermis de la fruta. Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Selefrut y toda la línea Agrogena.

APLICACIÓN FOLIAR

.Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos hortícolas para mejorar la vida post cosecha. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total (COT)	1,3%
Silicio (SiO ₂)	20,5%
Calcio (CaO)	8,9%
Boro (B ₂ O ₃)	0,1%
pH (dilución al 10%)	7,7%
Densidad (a 20 °C)	1,146%
Solubilidad (a 20°C)	95%
Materia Orgánica	2,3%



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogena@agrogena.com

FICHA TÉCNICA

FRUTIPAC



RECOMENDACIONES GENERALES

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	6-8	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Avellano Europeo y Nogal	4-6	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Vid de Mesa, Vid Vinificación	6-8	Fruto cuajado post raleo y repetir a los 5-7 días.
kiwi	3-4	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Arándano, frutilla y frambueso	3-4	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	3-4	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Palto	4-6	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Manzano y Peral	6-8	Fruto recién cuajado y repetir a los 5-7 días.
Olivo	4-6	Iniciar en primavera con follaje suficiente, cada 15 días.

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	4	Fruto cuajado, 40 días antes cosecha
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	2	40 y 30 días antes de cosecha.
Cereales, Papa y otros Cultivos	2	40 y 30 días antes de cosecha.



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com