

FICHA TÉCNICA KOLORFRUT



USO FOLIAR

Es una formulación líquida (SL) que contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona potasio, molibdeno para la promoción del color y maduración de la fruta. De no existir factores de manejo general o enfermedad que limite la expresión de la plantación, este producto tiene una rápida acción de Activación y Respuesta en el proceso de maduración de la fruta.

BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES DURANTE EL LLENADO Y MADURACIÓN FRUTA.

El silicio tiene como beneficio conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Mejor acopio y translocación de carbohidratos y disponibilidad de antocianinas.

Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Selefrut y toda la línea Agrogenera.

APLICACIÓN FOLIAR

.Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

COMPOSICIÓN

| CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL | % PESO/PESO |
|------------------------------|-------------|
| Carbono orgánico total (COT) | 1,2% |
| Silicio (SiO ₂) | 26% |
| Potasio (K ₂ O) | 12,7% |
| pH (dilución al 10%) | 6,0% |
| Densidad | 1,164% |
| Solubilidad (a 20°C) | 95% |
| Materia Orgánica | 2,2% |



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com

FICHA TÉCNICA

KOLORFRUT



RECOMENDACIONES GENERALES: USO FOLIAR, UNA A DOS APLICACIONES DE 5 LT POR HECTÁREA, DURANTE LA MADURACIÓN O EN EL PERIODO NECESARIO.

| FRUTALES | DOSIS ANUAL LT/HA | ÉPOCAS DE APLICACIÓN, DIVIDIR LA DOSIS TOTAL INDICADA |
|--|-------------------|---|
| Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino | 5-10 | 40 y 30 días antes de cosecha. |
| Avellano Europeo y Nogal | 3-6 | 40 días antes de cosecha. |
| Vid de Mesa, Vid Vinificación | 5-10 | Pre-pinta, pinta 20 y 40 %. |
| kiwi | 5-8 | Inicio llenado (enero) y llenado intermedio (febrero) |
| Arándano, frutilla y frambueso | 4-6 | 40 y 30 días antes de cosecha. |
| Naranja, Mandarino, Clementina, Limón | 5-8 | 40 y 30 días antes de cosecha. |
| Palto | 5 | 60 y 30 días antes de cosecha. |
| Manzano y Peral | 5-8 | 40 días antes de cosecha. |
| Olivo | 4 | 60 y 30 días antes de cosecha. |

| CULTIVOS Y HORTALIZAS | DOSIS CC/LT | ÉPOCAS DE APLICACIÓN |
|--|-------------|---------------------------|
| Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo, | 4 | Desde pinta en adelante. |
| Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras. | 4 | 30 días antes de cosecha. |
| Cereales, Papa y otros Cultivos | 4 | 30 días antes de cosecha. |



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com