

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN CINC



## USO FOLIAR Y SUELO

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona Cinc (Zn). Este producto tiene una rápida acción y eficacia de Activación y Respuesta en la planta. El Zn es necesario para la síntesis endógena del aminoácido triptófano y síntesis endógena de auxinas.

## BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES EN POST COSECHA

El silicio tiene el beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta.

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Quelagen Potasio, Selefrut y con toda la línea Agrogena.

## APLICACIÓN FOLIAR

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta.

Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 °C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

## EVITE APLICAR CON FRUTA CUAJADA;

el cinc (Zn) puede dañar la fruta en su epidermis.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

## COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total	0,56%
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	14,2%
Cinc (Zn)	5,0%
pH (dilución al 10%)	5,6%
Densidad (a 20 °C)	1,122%
Solubilidad (a 20° C)	100%
Materia Orgánica	01,00%



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN CINC



## RECOMENDACIONES GENERALES

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Avellano Europeo y Nogal	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	1-2	Antes y plena floración.
Kiwi	1-2	Antes de floración.
Arándano, frutilla y frambueso	1-2	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1-3	Botón floral y hasta floración.
Palto	2-3	En panícula y hasta inicio de caída de pétalos.
Manzano y Peral	1,0-2,0	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.
Olivo	3	En botón floral y hasta inicio de caída de pétalos.

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	1	En primavera.
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	1	En primavera.
Cereales, Papa y otros Cultivos	1	En primavera.



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: [agrogenera@agrogenera.com](mailto:agrogenera@agrogenera.com)